ZABIEG KOLONOSKOPII

DATA BADANIA:

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
dzień miesiąc rok

GODZINA BADANIA:

☐☐ : ☐☐

MIEJSCE BADANIA (szpital/zakład opieki zdrowotnej):

.....

.....

.....

.....

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Dieta

2-3 DNI PRZED BADANIEM

Zalecane jest spożywanie produktów ubogich w błonnik. Dopuszcza się spożywanie kisieli, kleików, makaronów, gotowanych ziemniaków bez skóry. Zaleca się spożywanie gotowanych mięs i ryb. Dopuszczalne są także soki owocowe, miód, herbata, kawa bez dodatku mleka, oraz czyste zupy i rosoły.

Należy unikać: produktów spożywczych bogatych w błonnik, np. pełnoziarnistego, brązowego chleba i innych produktów, które zawierają ziarna zbóż. Niedozwolone jest spożywanie tłustych mięs i wędlin oraz warzyw i owoców pestkowych.

24 GODZINY PRZED BADANIEM

Przestrzegana musi być dieta płynna lub półpłynna!
Dopuszcza się spożywanie płynów w postaci soków owocowych, wody mineralnej, lemoniady, kawy bez dodatku mleka, czystych zup i rosołów. Dozwolone jest także ssanie cukierków miętowych i jedzenie miodu.

W DNIU BADANIA

Do czasu badania nie wolno spożywać pokarmów!
Do czterech godzin przed badaniem (jeżeli nie planowane jest znieczulenie ogólne) dopuszcza się picie do 500 ml płynów niegazowanych i klarownych. Klarowny płyn to: woda, sok owocowy bez miąższu, herbata. W przypadku planowanego znieczulenia ogólnego w dniu badania należy powstrzymać się od przyjmowania płynów doustnych.

Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Michał Mik

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU KOLONOSKOPII Z UŻYCIEM PRODUKTU LECZNICZEGO MOVIPREP®

Informacja przeznaczona tylko dla pacjentów, którym zalecono oczyszczenie jelita przed zabiegiem kolonoskopii przy użyciu leku MOVIPREP®

MATERIAŁ EDUKACYJNY DLA PACJENTA



Dodać zawartość saszetki A i B do dzbanka z miarką o pojemności co najmniej 1litra.

Dolać wody, aż do poziomu 1 litra.

Mieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Roztwór MOVIPREP® powinien być przezroczysty lub odrobinę mętny. Może to zająć do 5 minut.

MOVIPREP® jest gotowy do wypicia.

POWTÓRZYĆ KROKI W CELU SPORZĄDZENIA DRUGIEJ DAWKI LEKU

Pacjent powinien się starać wypić pełną szklankę roztworu co 10-15 minut.
W czasie stosowania leku Moviprep zaleca się wypicie dodatkowo jeszcze jednego litra wody, aby zapobiec uczuciu pragnienia i odwodnieniu.

Ważne! Nie wolno przyjmować żadnych pokarmów stałych od chwili rozpoczęcia przyjmowania leku MOVIPREP® do chwili zakończenia badania.

SCHEMAT JEDNODNIOWY

- spożycie **dwóch litrów roztworu wieczorem** w dniu poprzedzającym badanie

DZIEŃ PRZED BADANIEM wieczór **2 Litry**

DZIEŃ BADANIA rano **BADANIE**

SCHEMAT PODZIELONY

- **spożycie 1 litra roztworu wieczorem** w dniu poprzedzającym badanie oraz **drugiego litra roztworu rano w dniu badania**

DZIEŃ PRZED BADANIEM wieczór **1 Litr**

DZIEŃ BADANIA **1 Litr** rano

DZIEŃ BADANIA południe **BADANIE**

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego MOVIPREP®. Data zatwierdzenia 23.11.2011 r.

Mov-PL-1409-065